

تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان  
Professional Producer of feed For Aquatic



## خوراک ماهی سی باس آسیایی

## Seabass Extruded Feed

سی باس از گونه های آسیایی گوشتخوار با نام باراموندی (Barramundi) شناخته می شود و قابل پرورش در استخر ها و مزارع دریایی ایران به ویژه در قفس های دریایی است که علاوه بر رشد سریع و توانایی سازگاری با شرایط محیطی از بازار خوبی در داخل و خارج کشور برخوردار است.

در فرموله کردن خوراک ماهی سی باس استفاده از مواد اولیه با کیفیت و دارای قابلیت هضم بالا، نسبت های مناسب مواد اولیه، بالانس اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

**ویژگی های خوراک سی باس شرکت دریادانه عبارتند از:** ضریب تبدیل غذایی مناسب و افزایش قابلیت هضم و جذب خوراک، بهبود عملکرد سیستم ایمنی آبی، افزایش مقاومت ماهی و تامین تمام احتیاجات ماهی در همه مراحل رشد، کاهش آلودگی آب استخر و شرایط ذکر شده سبب استقبال چشم گیر پرورش دهندگان از پرورش ماهی باراموندی شده است.



Email: [daryadanehdoroud@gmail.com](mailto:daryadanehdoroud@gmail.com)

## خوراک اکسترودر ماهی سی باس (جدول آنالیز شیمیایی)

| آنالیز شیمیایی خوراک ماهی سی باس آسیایی (باراموندی) |          |          |          |            |          |           |           |           |                  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| پرواری                                              |          | پرواری   |          | پیش پرواری |          | آغازین    |           |           | ترکیب شیمیایی    |
| SB-310                                              | SB-308   | SB-306   | SB-304   | SB-303     | SB-302   | SB3-00C-3 | SB-300C-2 | SB-300C-1 |                  |
| ۴۱-۴۳                                               | ۴۴-۴۶    | ۵۰-۵۲    | ۵۲-۵۴    | ۵۲-۵۴      | ۵۲-۵۴    | ۵۲-۵۴     | ۵۲-۵۴     | ۵۲-۵۴     | پروتئین خام      |
| ۱۴-۱۸                                               | ۱۴-۱۶    | ۱۱-۱۳    | ۹-۱۱     | ۹-۱۱       | ۹-۱۱     | ۹-۱۱      | ۹-۱۱      | ۹-۱۱      | چربی خام         |
| ۲-۳                                                 | ۲-۳      | ۱-۲      | ۱-۲      | ۱-۲        | ۱-۲      | ۱-۲       | ۱-۲       | ۱-۲       | فیبر خام         |
| ۸-۱۲                                                | ۸-۱۲     | ۹-۱۳     | ۹-۱۳     | ۹-۱۳       | ۹-۱۳     | ۹-۱۳      | ۹-۱۳      | ۹-۱۳      | خاکستر           |
| ۶-۸                                                 | ۶-۸      | ۶-۸      | ۶-۸      | ۶-۸        | ۶-۸      | ۶-۸       | ۶-۸       | ۶-۸       | رطوبت            |
| ۱/۲-۱/۴                                             | ۱/۲-۱/۴  | ۱/۳-۱/۵  | ۱/۳-۱/۵  | ۱/۳-۱/۵    | ۱/۳-۱/۵  | ۱/۳-۱/۵   | ۱/۳-۱/۵   | ۱/۳-۱/۵   | فسفر             |
| فرورونده                                            | فرورونده | فرورونده | فرورونده | فرورونده   | فرورونده | کرامبل    |           |           | فرم خوراک        |
| ۱۰                                                  | ۸        | ۶        | ۴        | ۳          | ۲        | ۰/۹-۱/۵   | ۰/۵-۰/۹   | ۰/۳-۰/۵   | میلی متر         |
| >۱۰۰۰                                               | ۷۵۰-۱۰۰۰ | ۳۰۰-۷۵۰  | ۱۵۰-۳۰۰  | ۵۰-۱۵۰     | ۱۰-۵۰    | ۵-۱۰      | ۲-۵       | ۰/۵-۲     | وزن ماهی         |
| ۳                                                   | ۳        | ۳        | ۳        | ۳          | ۳        | ۴         | ۴         | ۴         | دفعات خوراک ماهی |

**تذکره ۱:** جدول ذکر شده جهت راهنمایی ارائه شده است و متناسب با شرایط مزرعه و ماهیان متفاوت می باشد.

**تذکره ۲:** تعداد دفعات غذایی با درصد اکسیژن و دمای آب مزرعه ارتباط دارد.