



- ۱ برای محاسبه مقدار ژل مورد نیاز در ۶ وعده برای ۶ روز ابتدایی، ظرفیت سالن را تقسیم بر ۱۰۰۰ نموده و در عدد ۶۳ ضرب کنید. عدد به دست آمده مقدار مورد نیاز از پودر ژل بر حسب گرم می باشد.
 - ۲ مهم ترین وعده در هفته اول، وعده نخست در بدو ورود جوجه به سالن می باشد تا با توجه به جذابیت یوایی، بصری و خوشخواری اوماج تازه تهیه شده، جوجه ها در کمترین زمان ممکن به غذای مرطوب دسترسی پیدا کنند.
 - ۳ در مواردی که کیفیت جوجه پایین بوده و یا نیاز به حمایت بیشتری داشته باشد (طی مسافت طولانی بدون تغذیه اولیه در کارخانه جوجه کشی، دسترسی دیر هنگام به آب و غذا در سالن پرورش، کیفیت پایین استارتر و...) با مشورت دامپزشک، مشاور فارم و یا تیم پشتیبانی فنی شرکت، می توان تعداد وعده ی بیشتری را به جای یک وعده طی روز در نظر گرفت.
 - ۴ با توجه به دارا بودن ریز مغذی های فراوان و عدم وجود آنتی بیوتیک و نگهدارنده در ژل مغذی روپال چیک، همواره از محصول تازه تهیه شده استفاده گردد و اوماج تهیه شده حداکثر تا ۶ ساعت پس از آماده سازی مصرف شود.
 - ۵ در تمامی موارد مصرف، اوماج به صورت دستی داخل دان خوری ها ریخته شده و از دستگاه های اتوماتیک استفاده نشود.
- زمان پرهیز از مصرف: **نداره**

همراه با تکنولوژی روز دنیا

شرکت دانش بنیان
تهران طیور گبز
تولید کننده تخصصی انواع غذاهای فرارگ، دام، طیور و آبزیان
www.TehranToyur.ir



روبال چیک ویژه استفاده در سالن پرورش

اجزای تشکیل دهنده

عوامل ایجاد کننده ژل، رنگدانه های خوراکی، پروبیوتیک ها، پری بیوتیک ها، ال-کارتین، ترکیبات تقویت کننده ایمنی و کاهنده استرس، آنزیم های خوراکی و...

مزایای استفاده از ژل روبال چیک

۱ خوشخوراکی و افزایش مصرف خوراک

۲ کاهش تلفات و افزایش یکنواختی گله

۳ بهبود هضم و جذب مواد مغذی و در نهایت بهبود عملکرد

۴ کاهش اثرات سوء ناشی از استرس های محیطی مختلف طی دوره پرورش

۵ بهبود سطح و کاهش ضریب تغییرات عیار پادتن ها متعاقب واکسیناسیون



موارد استفاده از ژل روبال چیک

۱ در طول هفته اول پرورش

۲ در مواقع بروز بی اشتها

۳ پس از مصرف آنتی بیوتیک ها

۴ هنگام بروز تنش های محیطی و استرس



نحوه آماده سازی ژل مغذی روبال چیک :

مقدار مورد نیاز پودر خشک روبال چیک را مطابق دستورالعمل زیر محاسبه و آن را با ۷۰ برابر وزن خود، آب مخلوط نمایید. پس از گذشت ۱۰ دقیقه، توده ژل حاصله را با ۲ تا ۳ برابر وزن خود، خوراک خشک (مش، پلت یا کرامبل) در هم آمیخته و به صورت یکنواخت مخلوط کنید. اوماج حاصل شده را در اختیار جوجه ها قرار دهید تا در اسرع وقت استفاده شود.

میزان و نحوه مصرف ژل مغذی روبال چیک در هفته اول :

• هر قوطی ۲۸۰ گرمی حاوی دو بسته ۱۴۰ گرمی می باشد؛ هر بسته ۱۴۰ گرمی را با ۱۰۰۰ لیتر آب مخلوط کرده و پس از ده دقیقه با ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم خوراک (مش، پلت یا کرامبل) ترکیب نمایید.

• هر بسته ۱۴۰ گرمی برای مصرف یک وعده در روز برای بیست هزار قطعه در سه روز اول پرورش (روز اول، دوم و سوم) مناسب می باشد.

• با توجه به افزایش خوراک روزانه هر قوطی (حاوی دو بسته ۱۴۰ گرمی) برای مصرف یک وعده در روز برای بیست هزار قطعه در سه روز دوم پرورش (روز چهارم، پنجم و ششم) مناسب می باشد.